

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP -1-6-75 388412

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE-
FRANCHE-COMTÉ (Tél. 5-17)

(COTE-D'OR, DOUBS, HAUTE-SAONE, JURA, SAONE-ET-LOIRE, TERRITOIRE DE BELFORT)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 21, route de Sœurre - BEAUNE.

C. C. P. : DIJON 3.405-19

ABONNEMENT ANNUEL

15 F.

Supplément n° 5 AU BULLETIN N° 56 - MAI 1965

31 MAI 1965

V I G N E

MILDIU : Comme prévu dans notre note du 19 Mai, les premières taches de mildiou sont apparues les 27 et 28 Mai. Les très fortes précipitations des 29 et 30 Mai ont lessivé en partie les traitements et ont provoqué de nouvelles contaminations. Malgré les basses températures, la vigne poursuit sa croissance, il est de toute urgence de procéder à la protection des jeunes feuilles et grappes.

Un traitement (dose forte) est à appliquer avant le 5 Juin dernier délai. Veiller à apporter une quantité de matière active suffisante à l'hectare :

Exemples : - Zinèbe - cuivre 5 Kgs Hectare
- Phaltane 2 Kgs 5 Hectare
- Captane 4 Kgs Hectare
- Carbatène-cuivre 5 Kgs Hectare.

Poursuivre l'ébourgeonnage qui doit être particulièrement soigné.

Les vignes n'ayant reçu encore aucun traitement doivent faire l'objet d'une surveillance et d'une attention toutes particulières.

OLDIUM : Ajouter à la bouillie précédente un soufre micronisé mouillable.

VERS DE LA GRAPPE - PYRALE : Traitement indiqué ; dans le cas de la pyrale, utiliser de préférence un méthyl-parathion.

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES DU POMMIER & DU POIRIER : Les taches sur feuilles et sur fruits se font de plus en plus nombreuses. Un nouveau traitement est conseillé.

OLDIUM : Ajouter un anti-oidium. Poursuivre l'élimination des pousses contaminées.

CARPOCAPSE DES POIRES ET DES POIRES : Etant donné l'activité réduite due aux conditions climatiques défavorables, attendre pour traiter le relèvement de la température.

POMMES DE TERRE

MILDIU (En particulier zone légumière d'AUXONNE) : Les variétés hâtives ayant atteint un certain développement (30 - 35 cm) doivent faire l'objet d'un premier traitement en s'efforçant de bien couvrir la végétation par une pulvérisation fine aussi couvrante que possible avec l'un des fongicides mentionnés sur la liste publiée en début d'année.

DORYPHORE (Rappel) : Ajouter à la bouillie anti-mildiou un insecticide s'il y a présence de ce parasite.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements
Agricoles.

L'Inspecteur de la Protection des
Végétaux :
H. SOULIE.

Imprimerie de la Station de Bourgogne-Franche-Comté
Le Directeur-Gérant : L. BOUYX.

7103

